

## **ANNEX VIII**

---

- a) Ortofotomapes dels itineraris de seguiment
- b) Guia de camp simplificada

## Sector A. Vall de Sant Miquel de Campmajor




Figura 1. Sector A de seguiment: Vall de Sant Miquel de Campmajor; Itinerari 1: Les 3 Creus; Itinerari 2: La Guàrdia; Itinerari 3: La Coromina.

## **Sector B. Conca lacustre de l'Estany de Banyoles**



Figura 2. Sector B de seguiment: Conca lacustre de l'Estany de Banyoles; Itinerari 4: Amaradors - Lió; Itinerari 5: Can Morgat; Itinerari 6: Riera del Castellar; Itinerari 7: Aiguamolls de la Puda; Itinerari Hort del Castell.

## Sector C. Camós



Figura 3. Sector C de seguiment: Camós; Itinerari 8: l'Estanyell; S'inclou també la proposta d'ampliació d'aquest itinerari.

## Sector D. Pla de Martís - Pla d'Usall



Figura 4. Sector D de seguiment: Pla de Martís - Pla d'Usall. Itinerari 9: Salt d'Espolla; Itinerari 10: Platja d'Espolla.

## Guia de camp simplificada<sup>1</sup>

*Bufo bufo* (gripau comú)




Preferència per ambients permanents. Una cua més arrodonida que la del *Bufo calamita*.

*Bufo calamita* (gripau corredor)




Preferència per ambients efímers i temporanis. Una taca blanca a la part ventral a prop de la boca.

*Hyla meridionalis* (reineta)




Coloració clareta, amb dos línies negres molt marcades a la cua. Ulls aparentment molt separats en visió dorsal. Colors brillants a la panxa.

*Pelobates cultripes* (gripau d'esperons)




Té les larves més grans de totes, els primers estadis poden confondre's amb *H. meridionalis*. Una cua molt punxaguda i una bec molt fort i desenvolupat.

*Alytes obstetricans* (tòtil)



Cara molt arrodonida, cua normalment tacada de negre i blanc. Espiracle ventral dibuixant un triangle blanc generalment apparent a la part posterior de la panxa.

*Pelodytes punctatus* (granoteta de punts)



Larva de colors marrons, cua moltes vegades també tacada. L'espiracle és lateral. A la cresta de la cua normalment s'aprecia molt bé un reticulat de fibres.

*Pelophylax perezi* (granota verda)



Larves de colors clarets, amb taques blanques o claretes distribuïdes per tot el cos i la cua. Preferència per ambients permanents i de finals de primavera, principis d'estiu.


*Rana temporaria* (granota roja)



Larva de coloració molt fosca, amb taques blanques i brillants sobre el negre, molt més abundants a la part ventral del cos. Espècie explosiva fàcil de trobar a finals d'hivern, principis de primavera.


<sup>1</sup> Dibuixos i fotografies elaborades per la línia d'herpetologia de la Universitat de Barcelona per al programa SAC.

*Discoglossus pictus* (granota pintada)





Coloració uniforme de color marron. Cap i cua molt arrodonides. L'espiracle també és ventral com en el cas del tòtil però no tant apparent.

Mesures de les larves d'anurs



<i>Bufo bufo</i>	- 25 mm
<i>Bufo calamita</i>	- 21 mm
<i>Hyla meridionalis</i>	- 42 mm
<i>Pelobates cultripes</i>	- 71 mm
<i>Alytes obstetricans</i>	- 50-70 mm
<i>Pelodytes punctatus</i>	- 51 mm
<i>Pelophylax perezi</i>	- 56 mm
<i>Rana temporaria</i>	- 32 mm
<i>Discoglossus pictus</i>	- 22 mm

*Triturus marmoratus* (tritó verd)



Coloració groguenca, una línia a l'alçada dels ulls bastant marcada. El final de la cresta molt afilat, i un dits de les extremitats molt llargs.

*Lissotriton helveticus* (Tritó palmat)




Color semblant a la del tritó verd, però sense la línia a l'alçada dels ulls. Cua molt arrodonida i un dits normals.

*Salamandra salamandra* (salamandra)




Una forma molt compacte, de color fosc o negre en els primers estadis, al final del seu desenvolupament van aparegut els taques grogues i negres tipiques dels adults. En tots els estadis s'aprecien molt bé unes taques blanques a la base de les extremitats.

*Pleurodeles waltli* (ofegabous)



Larva gran i robusta de coloració grisenc. Ulls en disposició dorsal i bastant petits. La cresta acaba just sobre el cap.



*Bufo bufo*

amplada del cordó 5-8 mm



*Bufo calamita*

amplada del cordó 4-6 mm




*Pelodytes punctatus*  
ous marrons i negres, posta fixada a la  
vegetació en petits paquets 30-50 mm  
de llarg.



*Pelobates cultripes*

ous marrons i negres, posta fixada a la  
vegetació en un paquet molt gran i  
ample 40-100 mm de llarg.



*Pelophylax perezi*  
ous blanc i marrons, normalment no  
lligats a la vegetació i coberts d'algues  
verdes.



*Hyla meridionalis*  
ous blanc i marrons, lligats  
a la vegetació sumergida i  
en paquets molt petits (35-  
100 ous). No acostumen a  
tenir algues.



*Rana temporaria*  
postes multitudinaries, totes les postes  
agrupades i no lligades a cap element.  
Ous molt inflats.



*Discoglossus pictus*

ous petits i no  
empaquetats entre ells,  
generalment els ous  
queden disposats  
directament al fons.  
Preferència per ambi-



