

***Sicyos angulatus* L. al Gironès*****Sicyos angulatus* L. in Gironès (Catalonia)**

Rebut: 06.11.95  
Acceptat: 29.04.96

Cucurbitàcia anual que hem recollit al llarg del riu Ter, als municipis de Girona, Celrà i Bordils (Gironès, quadrats UTM 31T DG84, DG85 i DG95), entre els 40 i 65 m d'altitud. Es fa en el domini del bosc de ribera, a les salzedes i pollancredes que colonitzen els sorrals de la llera i els marges del riu, on és localment abundant.

Originària de l'est d'Amèrica del Nord, fou introduïda a Europa a principis del segle XVIII com a ornamental (Fournier, 1952, vol. III: 333) i es troba naturalitzada en llocs humits a diversos països europeus. No en coneixem cap indicació a la península Ibèrica (Casasayas, 1989; Castroviejo, 1993), ni l'hem vista mai plantada o cultivada a les comarques gironines.

Es tracta d'una planta anual enfiladissa, amb circells ramificats i monoica, caràcters que la diferencien de *Bryonia cretica* L. que creix també en aquests ambients. Presenta fulles cordades, les basals amb un limbe de més de 15 cm, i flors axil·lars amb periant blanquinós en inflorescències pedunculades. Les flors masculines es disposen en raïm i presenten tres estams amb els filaments connats, mentre que les femenines es troben en glomèruls pènduls, amb un ovari unilocular que conté un sol primordi seminal. El fruit és ovoide i sèssil, hirsut en estat juvenil i recobert d'agullons prims amb petites setes retrorses, que a la maduresa assolix uns 15 mm de llargada i esdevé coriàci (vegeu fig. 3).

ENRIC FÀBREGAS, LLUÍS VILAR & JOAN FONT

Departament de Ciències Ambientals. Plaça Hospital, 6.  
E-17071 Girona.